## Relevé des Élatérides recueillis dans les Iles Malaises, à la Nouvelle-Guinée et au Cap York, par MM. G. Doria, O. Beccari et L. M. D'Albertis, par E. CANDÈZE.

---

J'ai fait connaître successivement, dans des notices antérieures, les Élatérides récoltés par M. Lewis au Japon et par M. Semper dans l'Archipel des Philippines.

La présente énumération vient encore enrichir l'histoire des Élatérides des îles de l'extrême Orient.

Des 119 espèces qui y sont renseignées, la moitié sont nouvelles. Ce nombre n'a rien qui étonne si l'on songe que le contingent le plus important de la récolte a été fourni par la Nouvelle-Guinée, terre immense dont les riches productions étaient naguère presque inconnues et dont nous ne connaissons encore, à l'heure qu'il est, qu'une très-infime partie, eu égard à ce qu'elle promet, sans doute, à nos Musées dans un avenir plus ou moins rapproché.

### AGRYPNITES.

#### Agrypnus, Eschs.

1. **A. resectus**, Cand., *Monogr.* I, p. 45.

Cette espèce a été prise dans les Iles de la Baie du Geelvink et autres points de la Nouvelle-Guinée septentr. par MM. Beccari et L. M. D'Albertis. Le premier en a rapporté également un exemplaire des Iles Arou et un autre des Iles Kei.

2. **A. aequalis**, Cand., *Monogr.* I, p. 25.

Buru et Ternate (*Beccari*).

Ressemble au précédent, mais il a les élytres moins distinctement striées, les angles postérieurs du prothorax aigus et non tronqués, et les élytres peu ou point échancrées au bout.

3. **A. mucronatus**, Cand., *Monogr.* I, p. 42 — *Révis.*, I, p. 12.
Sarawak, Bornéo (*Doria* et *Beccari*).

4. **A. Mastersi**, Mac Leay, *Trans. entom. Soc. N. S. Wales* II, p. 249 — Cand. *Révis.* I, p. 13.

J'ai dit ailleurs combien cette espèce est variable d'aspect tout en conservant une homogénéité dans les caractères essentiels qui ne laisse aucun doute sur son unité spécifique. Plusieurs spécimens, trouvés par M. D'Albertis à Somerset (Cap York), se distinguent par une taille plus grande, une pubescence moins apparente et les stries des élytres plus ou moins effacées. Il convient de faire remarquer qu'entre cette forme et les spécimens les plus pubescents et les plus striés, j'ai vu tous les passages possibles, d'autres provenances.

### Adelocera, Latr.

5. **A. cribrata**, Cand., *Monogr.* I, p. 63 — *Révis.* I, p. 25.
Labuan (*Beccari*).

6. **A. geographica**, Cand., *Révis.* I, p. 24.
Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

### Lacon, Cast.

7. **L. tostus**, Cand., *Monogr.* I, p. 129.
Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

8. **L. lupinosus**, Cand., *Monogr.* I, p. 130.
Sarawak, Bornéo (*Doria* et *Beccari*).

9. **L. pauper**, (nov. spec.) Tcibodas, Java (*Beccari*).

*Fusco-niger pilis squamiformibus squalidis minus dense sparsis; prothorace longitudine latiore, dense punctato, medio transversim elevato, lateribus arcuato, versus basin subcrenulato, angulis posticis apice paulo divaricatis, truncatis; elytris brevibus, apice attenuatis,*

*punctato-striatis; sulcis quatuor distinctis.* — Long. 8 millim., lat. 2 $^1/_2$ millim.

Cette espèce, qui a l'apparence des espèces australiennes, se place à côté de l'*afflictus* dont elle ne diffère guère que par son prothorax plus densément ponctué, à angles postérieurs plus développés et un peu divergents, par ses élytres plus profondément striées, les points des stries étant plus serrés.

10. **L. discedens** (nov. sp.), Ternate (*Beccari*).

*Fusco-brunneus, sub-opacus, dupliciter, squalide squamulosus; prothorace latitudine paulo longiore, basi apiceque leviter angustato, lateribus arcuatis, carina marginatis, parum convexo, transverse medio elevato, disco inaequali, inaequaliter punctato, medio canaliculato, angulis posticis truncatis; elytris prothorace vix latioribus, ultra medium paulo dilatatis, striato fortiter punctatis, interstitiis planis, dense punctulatis; sulcis tarsorum nullis.* — Long. 15 millim., lat. 4 millim.

La carène des angles postérieurs longuement prolongée, le long du bord latéral du prothorax, détermine la place de cette espèce dans un petit groupe dont les *L. cervinus, apodixus, Wallacei* font partie. Outre ce caractère qui ne se remarque que dans un petit nombre d'espèces, celle-ci se distingue encore par ses écailles ou poils squamiformes disposés sans ordre et de grandeur manifestement différente, les unes plus larges et plus grandes, les autres plus courtes ou plus étroites.

11. **L. serricollis**, Cand., *Monogr.* I, p. 140.
Sarawak, Bornéo (*Doria* et *Beccari*).

12. **L. Wallacei**, Cand., *Révis.* I, p. 80.
Célèbes, Kandari (*Beccari*).

13. **L. macroderus**, Cand., *Révis.* I, p. 79.
Andaï, Nouvelle-Guinée septentr. (*D'Albertis*); Amboine (*Beccari*).

14. **L. gracilis**, Cand., *Révis.* I, p. 83.

Nouvelle-Guinée, Andaï, Dorey Hum, Ramoi (*Beccari*); Pulo Faor (*D'Albertis*); Ternate (*Beccari*).

Les exemplaires de Ternate sont un peu plus opaques que ceux de la Nouvelle-Guinée, surtout vers la partie centrale du prothorax, toutefois il n'y a pas d'autres différences essentielles.

15. **L. subsericeus** (nov. sp.) Nouvelle-Guinée, Hatam (*Beccari*).

*Rufo-brunneus, parallelus, fulvo-pilosulus, subsericeus; mento valde prominenti; prothorace longitudine latiore, sub-parallelo, parum convexo, punctato, angulis anticis prominulis, posticis brevibus truncatis, extus longe tenuiter carinatis; elytris prothorace haud latioribus, punctato-striatis, interstitiis planis inaequaliter pilosis; sulcis tarsorum nullis.* — Long. 10 millim., lat. 2 $^1/_2$ millim.

Caractérisé surtout par la carène allongée des angles postérieurs du prothorax, ce qui le place à coté du *cervinus*, par ses élytres rayées, à cause de l'inégalité de répartition des poils, ceux des intervalles impairs étant plus serrés que les autres, enfin par sa mentonnière développée. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire.

16. **L. impressus** (nov. sp.) Nouvelle-Guinée, Andai (*Beccari*).

*Fusco-niger, sub-opacus, fusco-pilosulus; prothorace latitudini longitudine aequali, basi apiceque angustato, haud crenulato, disco convexo, grosse punctato, antice biimpresso, angulis anticis prominulis rotundatis, posticis divaricatis, acutis, carinatis; elytris ultra medium parallelis, apice attenuatis, suturam versus depressis, striato fortiter punctatis; sulcis tarsorum nullis; antennis pedibusque brunneis.* — Long. 15 millim., lat. 4 millim.

*Facies* des espèces australiennes et plus particulièrement du *L. assus*. Il se place à la suite du *L. scropha*.

17. **L. princeps**, Cand., *Révis.* I, p. 89.

Somerset, Cap York (*D'Albertis*).

18. **L. variolus**, Cand., *Révis.* I, p. 92.

Somerset, Cap York (*D'Albertis*).

19. **L. Octavus**, Cand. *Révis.* I, p. 95.
Somerset, Cap York (*D'Albertis*).

20. **L. crassus**, Cand. *Révis.* I, p. 88.
Somerset, Cap York (*D'Albertis*).

21. **L. asperulatus** (nov. sp.) Ins. Yule, N. Guin. austr. (*D'Albertis*).

*Fuliginosus, opacus, griseo-squamulosus; prothorace longitudine latiore, convexo, fortiter et inaequaliter punctato, angulis posticis brevibus, truncatis; elytris convexis, striis punctatis, interstitiis basi granulatis; sulcis tarsorum nullis.* — Long. 8-10 millim, lat. 2 $^1/_2$-3 millim.

J'ai sous les yeux une centaine d'exemplaires de ce type. Si je n'en avais qu'un ou deux je n'oserais le séparer du *crassus* avec lequel il a une grande ressemblance. Cependant tous les spécimens de l'Ile Yule diffèrent de l'espèce du Cap York par un prothorax moins bombé et autrement ponctué: les points sont ici moins larges et conséquemment plus écartés entre eux; ils sont aussi plus inégaux. La base des élytres est, comme chez le *crassus,* fortement granuleuse; les bords latéraux sont doublés d'une fine carène, caractère qui n'a pas été mentionné, bien qu'existant également à un plus faible degré, chez le même. L'aspect général est semblable.

22. **L. cinerascens** (nov. sp.) Ins. Yule, Nov. Guineae australis (*D'Albertis*).

*Fuscus, opacus, dense cinereo-pubescens; prothorace longitudine latiore, dense fortiter punctato, parum convexo, lateribus haud crenulatis, angulis posticis vix porrectis, disco maculis pilosis plurimis cinereis; elytris aequaliter convexis, punctato-striatis, interstitiis planis; sulcis tarsorum metathoracis nullis, prothoracis male definitis.* — Long. 13 millim., lat. 4 millim.

Un seul exemplaire. Il rappelle par son aspect général notre *L. murinus,* ou mieux certaines espèces de l'Inde analogues à ce dernier, ce qu'il doit à la pubescence blanchâtre, fine et

dense des intervalles des stries des élytres, à l'opposé de ce qu'on observe chez presque toutes les espèces australiennes. Ce caractère le fera aisément reconnaître.

### Meristhus.

23. **M. minusculus**, Cand., *Révis.* I, p. 104.
Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

### Alaus, Eschs.

24. **A. lacteus**, Fabr., *System. Eleuth.* II.
Sarawak, Bornéo (*Doria* et *Beccari*).

25. **A. appendiculatus**, Herbst, Käf.
Amboina, Buru (*Beccari*).

26. **A. mortuus**, Thoms., *Rev. Zool.* 1856, p. 473, pl. 24.
Sarawak, Bornéo (*Doria* et *Beccari*).

27. **A. lactellus**, Cand., *Révis.* I, p. 130.
Sarawak, Bornéo (*Doria* et *Beccari*).

28. **A. Albertisi** (nov. sp.) Nouvelle-Guinée, Andaï (*D'Albertis*).
*Fusco-testaceus, nigro-maculatus, squamulis minimis albidis minus dense vestitus; prothorace latitudine longiore, convexo, basi medio breviter carinato; elytris brevibus, parallelis, striato-punctatis, apice emarginatis, basi bituberculatis, subtus, antennis pedibusque brunneis.* — Long. 10 millim., lat. 3 millim.

Très-petit. D'une couleur jaunâtre obscur varié de petites taches noires, les élytres présentant de chaque côté une grande tache peu apparente virant au verdâtre, tout le corp revêtu de petites écailles blanches non confluentes et modifiant peu la couleur du fond. Prothorax un peu plus long que large, curvilinéairement rétréci au sommet, convexe, finement ponctué, présentant au milieu, vers la base, une courte carène, ses an-

gles postérieurs à peine divergents, carénés. Écusson déclive, pentagonal. Élytres de la largeur du prothorax et moins de trois fois plus longues, parallèles dans plus de leur moitié antérieure, échancrées au bout, striées-ponctuées, le troisième intervalle portant un tubercule à la base, sur un plan postérieur à l'écusson. Dessous, antennes et pattes brunes, le prosternum et les épipleures noirâtres.

Un seul individu ♀.

29. **A. elaps**, Cand., *Révis.*, p. 132.

Un exemplaire de Labuan (*Beccari*).

30. **A. Boreli**, Cand., *Monogr.* I, p. 229.

Le Musée Civique de Gênes possède un assez grand nombre d'exemplaires provenant de Halmaheira et de Ternate. Un individu originaire de Mansinam, à la Nouvelle-Guinée, ne m'a présenté aucune différence notable avec ceux des Moluques, sinon qu'il est un peu plus foncé en couleur, moins tacheté, c'est-à-dire que les teintes sont plus fondues.

31. **A. cerastes**, Cand., *Révis.* I, p. 134.

M. Beccari en a récolté un grand nombre dans les Iles de la Baie du Geelvink, à Andaï, Dorey et Wa Samson (Nouvelle-Guinée septentrionale), conformes, pour la plupart, au type primitivement décrit. Quelques-uns, toutefois, méritent une mention spéciale, car ils constituent une variété remarquable. Ils sont plus grands et d'une teinte générale plus noire, le tubercule de la base des élytres est plus fort, la carène basilaire du prothorax mieux marquée, en un mot ils semblent en être les grands développements.

32. **A. regalis**, Cand., *Révis.* I, p. 135.

Amboine, Buru (*Beccari*); Goram (*D'Albertis*).

Un exemplaire de cette dernière localité est entièrement noir, comme la variété propre à Ceram.

33. **A. scytale**, Cand., *Monogr.* I, p. 228.

L'*habitat* de cette espèce paraît étendu. Décrite primitivement sur des exemplaires originaires des Philippines, elle a été retrouvée depuis à Célèbes. Plus récemment le D.r Beccari l'a capturée à Andaï, Nouvelle-Guinée. L'exemplaire que j'ai sous les yeux ne diffère en rien de ceux trouvés par M.r Semper à Luçon.

34. **A. obliquus**, Cand., *Révis.* I, p. 143.

Deux individus trouvés par le D.r Beccari, l'un à Andaï, l'autre à Dorey, où M. Wallace avait antérieurement capturé l'espèce.

35. **A. angularis**, Cand., *Révis.* I, p. 145.

Un exemplaire trouvé par le D.r Beccari à Ramoi, Nouvelle-Guinée septentrionale vis à vis de l'Ile de Sorong. Sa taille (20 millim.) est plus grande que celle des individus récoltés à Misol par M. Wallace.

36. **A. arfakianus**, Gestro, *Ann. Mus. Civ. Genova* 1875, Vol. VII, p. 1003.

Un exemplaire trouvé par le D.r Beccari sur les Monts Arfak; à Hatam, Nouvelle-Guinée. La forme de cette espèce est remarquable: elle tend manifestement à se rapprocher de celle des *Chalcolepidius* américains.

37. **A. Doriae**, Gestro, *Ann. Mus. Civ. Genova* 1875, Vol. VII, p. 1000.

Plusieurs exemplaires trouvés par le même collecteur dans la même localité que le précédent. Cet *Alaus* rappelle par sa taille, sa coloration et sa tournure l'*A. gigas* du Cap York.

38. **A. sericeus**, Cand. *Révis.* I, pag. 148.

Ile Yule, Nouv. Guinée méridionale (*D'Albertis*).

Cette espèce, décrite pour la première fois d'après un exemplaire originaire de Rockhampton, paraît plutôt une espèce nord-australienne étendue jusqu'à la Nouvelle-Guinée, qu'une espèce

propre à ce dernier pays. Elle se retrouvera probablement dans toute la région intermédiaire.

M. D'Albertis a encore trouvé, dans le voisinage de l'île Yule en terre ferme, un *Alaus*, vraisemblablement nouveau, mais que son état de développement imparfait m'empêche de décrire ici. Il a les teintes et les élytres tuberculeuses et échancrées du *cerastes*, mais son prothorax est plus bombé, plus cylindrique, rappelant par sa forme celui du *Boreli*. Je l'ai nommé provisoirement *A. acontias*.

## CHALCOLÉPIDIITES.

### Campsosternus.

39. **C. Candezei**, Dohrn, *Stett. Ent. Zeitschr.* 1875, p. 17.
Sarawak, Bornéo (*Doria* et *Beccari*).

J'ai déjà signalé ailleurs la rareté des espèces de ce beau genre dans la Malaisie, alors qu'il est si répandu dans les deux presqu'îles indiennes. Sa répartition paraît donc le contraire de celle des *Alaus* des mêmes régions. Les *Campsosternus* déjà réduits à Sumatra, Bornéo, Java et aux Philippines, semblent disparaître complétement à l'orient de ces îles. Jusqu'ici du moins il n'en a pas été rencontré dans les Moluques et à la Nouvelle-Guinée.

## TÉTRALOBITES.

### Tetralobus.

On sait que ce genre, l'un des plus remarquables et des mieux caractérisés de la famille, est essentiellement africain.

Ce n'est donc pas une des moins curieuses particularités de la distribution géographique des insectes d'en retrouver, dans le continent austral, des représentants très authentiques et appartenant d'une façon indéniable à cette coupe générique. Aux espèces déjà connues vient s'ajouter la suivante dont je n'ai

sous les yeux, malheureusement, qu'une femelle immature, mais que je décris néanmoins à cause de ses caractères parfaitement tranchés.

40. **T. Albertisi** (nov. sp.) Somerset (*D'Albertis*).

*Fusco-brunneus, opacus, glaber, antennis* (♀) *serratis, ferrugineis; prothorace latitudine longiore, inaequali, cum capite creberrime et grosse punctato, angulis posticis divaricatis, apice retrorsum flexis, acutissimis; elytris parallelis, sulcatis, punctulatis, dilute ferrugineis; metathorace pedibusque pilosis.* — Long. 30 millim., lat. 6 millim.

(♀). Allongée et parallèle, brunâtre avec les élytres d'une teinte plus claire, glabre en dessus. Antennes dentées, ferrugineux clair. Front sémi-elliptique, perpendiculaire, largement sillonné et rugueusement ponctué. Prothorax plus long que large, modérément bombé, inégal en dessus et rugueusement ponctué, ses bords latéraux flexueux, ses angles saillants, les antérieurs tombants, creusés, arrondis au bout, les postérieurs divergents, recourbés en arrière et très-aigus, spiniformes au sommet. Écusson cordiforme. Élytres parallèles, sillonnées, finement pointillées. Métathorax et pattes poilus, surtout le premier; tarses très-brièvement lamellés.

Cette espèce se place auprès du *T. cylindriformis* Cand. (*T. Fortnumi* Hope?).

## DICRÉPIDIITES.

### Sephilus (gen. nov.).

*Frons antice carinata; spatium nasale maximum; palporum articulus tertius triangularis.*

*Antennae breves, undecim articulatae, articulo primo crasso, secundo minimo, globoso, tertio quarto aequali, triangulari, ultimo angusto, elongato, acuminato.*

*Prosternum mucrone leviter incurvato, suturis lateralibus rectis, late et profunde canaliculatis.*

*Mesosternum declive.*

*Coxarum posteriorum laminae extus sensim attenuatae.*

*Pedes breves; tarsorum articulo secundo et tertio longe, primo breviter, appendiculatis.*

Le caractère essentiel du genre réside dans la rectitude, la grandeur et la profondeur des canaux prothoraciques, presque aussi marqués que chez les *Agrypnites*, en même temps que dans le développement exceptionnel du front et la hauteur de la plaque nasale.

L'espèce qui le constitue pourrait à la rigueur rentrer, soit dans le genre *Psephus*, soit dans le genre *Elius*, dont les caractères seraient quelque peu modifiés pour permettre cette introduction. Toutefois j'ai cru devoir en faire une coupe générique spéciale en attendant la révision complète des *Dicrépidiites* des Indes orientales, qui ne pourra se faire convenablement que quand on connaîtra un nombre plus considérable d'espèces de cette région.

41. **S. frontalis** (nov. sp.)

Sarawak, Bornéo (*Doria* et *Beccari*).

*Fuscus, pube fuscescente dense vestitus; fronte longe porrecta, latissima; prothorace latitudini longitudine aequali, apice arcuatim angustato, aequaliter convexo, crebre punctato, angulis posticis vix divaricatis, acute carinatis; elytris ultra medium parallelis, striis punctatis; pedibus obscure rufis.* — Long. 25 mill., lat. 6 mill.

Je possède des exemplaires de la même espèce provenant de la presqu'île de Malacca.

## EUDACTYLITES.

### Pachyderes, Latr.

42. **P. ruficollis**, Guér., *Icon.* XII, 5.

Sarawak, Bornéo (*Doria* et *Beccari*).

43. **P. apicalis**, Cand., *Bull. Acad. Brux.* 1865, 24.

Sarawak, Bornéo (*Doria* et *Beccari*).

## MONOCRÉPIDIITES.

### Monocrepidius, Eschs.

44. **M. mucronatus** (nov. sp.) Hatam dans les Monts Arfak, Nouvelle-Guinée septentrionale (*Beccari*).

*Fulvo-brunneus, fulvo-pubescens; fronte quadrata; antennis articulo tertio quarto breviore; prothorace latitudine longiore, a basi angustato depresso, crebre subtiliter punctato, angulis posticis bicarinatis; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, punctulatis, apice emarginatis, mucronatis.* — Long. 18 millim., lat. $4^2/_3$ millim.

Tout entier d'un brun jaunâtre clair tirant au bai, revêtu d'une fine pubescence couchée, soyeuse, fauve. Front carré, ponctué. Antennes médiocres, de la couleur générale, leur troisième article plus court que le quatrième et plus long que le deuxième. Prothorax plus long que large, atténué depuis la base jusqu'au sommet avec les côtés peu arqués, assez déprimé, couvert de points fins assez serrés sur les parties latérales, ses angles postérieurs un peu divergents, surmontés de deux carènes rapprochées dont l'extérieure est très-longue. Écusson pentagonal, plat, déclive. Élytres de la largeur du prothorax et un peu plus de deux fois plus longues, arquées sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles sont échancrées et mucronées à l'angle externe de l'échancrure, un peu plus convexes que le prothorax, finement ponctuées-striées, les intervalles plats et très-finement pointillés. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus.

Cette espèce, dont je n'ai vu qu'un seul exemplaire, se distingue par ses élytres fortement échancrées et mucronées au bout, caractère qu'elle partage avec un petit nombres d'espèces presque exclusivement américaines. Elle se place à côté du *M. variabilis*, de la Nouvelle-Caledonie.

45. **M. guttatus** (nov. sp.) Aqui Conora, Ternate (*Beccari*).

*Elongatus, brunneus, griseo-pubescens; prothorace latitudine longiore, a basi angustato, crebre punctato, medio nigricante, angulis posticis tenuibus, divaricatis, bicarinatis; elytris punctato-striatis,*

*apice emarginatis, guttulis nigris adspersis.* — Long. 18 millim., lat. 3 $^1/_2$ millim.

Assez étroit et allongé, d'un brun clair plus ou moins ferrugineux, revêtu assez densément d'une pubescence couchée, modifiant notablement par son reflet gris la teinte des téguments. Antennes courtes, leur troisième article intermédiaire quant à la longueur entre le précédent et le suivant. Prothorax plus long que large, rétréci depuis la base jusqu'au sommet, densément ponctué, marqué d'une raie noirâtre fondue sur les bords, noire au milieu, ses angles postérieurs grêles, divergents, bicarénés. Écusson pentagonal, déclive. Élytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus longues, arquées sur les côtés, convexes, ponctuées-striées, les intervalles un peu convexes et densément pointillés, le troisième un peu élevé à la base, échancrées au bout, semées de points noirs plus ou moins nombreux, manquant parfois complètement. Dessous brunâtre, pattes plus claires.

46. **M. similis** (nov. spec.) Nouvelle-Guinée, Korido dans l'Ile de Misori (*Beccari*).

*Elongatus, ferrugineo-brunneus, fulvo pubescens; prothorace latitudine longiore, a basi paulo angustato, convexo, minus dense punctato, medio vitta nigricanti, angulis posticis acutis, bicarinatis; scutello convexiusculo, obscuro; elytris punctato-striatis, interstitiis convexis, punctatis, apice emarginatis.* — Long. 15 millim., lat. 3 millim.

Il ressemble beaucoup au précédent, au moins à la variété sans taches sur les élytres, mais il en diffère par quelques caractères de détails tel que les suivants: sa pubescence est moins grise et moins apparente, son prothorax est plus convexe, moins densément ponctué, à angles postérieurs moins divergents, son écusson est plus bombé et d'une teinte obscure, les intervalles des stries des élytres sont plus bombés et plus fortement ponctués, enfin le troisième n'est nullement élevé à la base ainsi qu'on l'observe chez le *guttatus*.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire.

47. **M. arouensis** (nov. sp.) Ins. Arou (*Beccari*).

*Latiusculus, fuscus, griseo-pubescens; prothorace longitudine vix latiore, apice arcuatim angustato, convexo, creberrime inaequaliter punctato, angulis posticis fortiter carinatis; elytris brevibus, punctato-striatis, interstitiis convexis, punctatis; pedibus flavis.* — Long. 10 millim., lat. 3 millim.

Assez long, brunâtre obscur, revêtu d'une fine pubescence grise; front très-ponctué, portant à la base une ligne élevée. Antennes d'un brun rougeâtre. Prothorax presque aussi long que large, rétréci au sommet, médiocrement bombé, couvert de points très-denses et inégaux en grosseur, ses angles postérieurs non divergents, fortement carénés. Élytres de la largeur du prothorax et deux fois plus longues, arquées sur les côtés, deprimées vers la suture, ponctuées-striées, les intervalles convexes et très-ponctués, entières au bout. Pattes d'un flave brunâtre. Les flancs du prothorax sont creusés en gouttière le long du bord et la lamelle du quatrième article des tarses est large.

Plusieurs exemplaires.

48. **M. Yulensis** (nov. sp.) Ins. Yule, N. Guin. austral. (*D'Albertis*).

*Latiusculus, fuscus, griseo-pubescens; prothorace latitudine paulo longiore, apice arcuatim angustato, parum convexo, regulariter, aequaliter et confertim punctato, angulis posticis retrorsum productis, bicarinatis; elytris prothorace paulo angustioribus, brevibus punctato-striatis, interstitiis planis, confertim punctatis; antennis pedibusque rufo-castaneis.* — Long. 11 millim., lat. 3 millim.

Aspect général du précédent. Il s'en distingue par son prothorax plus allongé, plus également ponctué et surtout par la présence de deux carènes bien distinctes aux angles postérieurs. Cette longueur plus grande du prothorax rend les élytres relativement plus courtes. Comme chez l'*arouensis*, les flancs du prothorax sont creusés en gouttière et la lamelle du quatrième article des tarses est large.

49. **M. horistonotus** (nov. sp.) N. Guin. (*D'Albertis*).

*Latiusculus, fuscus, subtiliter griseo-pubescens; prothorace lon-*

*gitudine vix latiore, basi apiceque angustato, convexo, creberrime inaequaliter punctato, angulis posticis brevibus, carinatis; elytris brevibus, basi leviter angustatis, punctato-striatis, interstitiis apice praesertim convexis, punctatis; pedibus pallidis.* — Long. 10 millim., lat. 3 millim.

Il ressemble beaucoup au précédent; cependant sa forme générale est différente. Le prothorax et les élytres retrécis tous deux à la base lui donne une certaine ressemblance avec les *Cardiophorites* du genre *Horistonotus.* Il se distingue en outre par les intervalles des stries des élytres plus convexes, surtout au sommet.

Je n'en ai vu qu'un seul spécimen.

50. **M. pauperatus** (nov. sp.) Ternate, N. Guin. (*Beccari*).

*Brevis, fuscus, subtiliter griseo-pubescens; prothorace longitudine vix latiore, apice fortius basi vix angustato, convexo, creberrime sub-aequaliter punctato, angulis posticis brevibus, carinatis; elytris punctato-striatis, interstitiis convexis punctatis, pedibus flavis.* — Long. 7 millim., lat. 2 millim.

Fort voisin des deux précédents, dont il semble une forme intermédiaire en ce qui concerne le retrécissement de la base du prothorax, qui est nul chez l'*arouensis* et très prononcé chez l'*horistonotus,* tandis qu'ici il est léger; la taille de cette espèce est toujours plus petite, le prothorax est plus également ponctué; ses quatre angles sont généralement teintés de rougeâtre.

J'en ai vu plusieurs exemplaires.

51. **M. corniculatus** (nov. sp.). N. Guin. sept. Ramoi (*Beccari*).

*Brunneo-niger, tenuiter pubescens; fronte rufa; prothorace latitudine longiore, convexo, crebre regulariter punctato, basi medio tuberculato, angulis posticis retrorsum productis, carinatis; elytris brevibus, punctato-striatis, interstitiis convexis, punctulatis, apice oblique truncatis, plagis quatuor parum distinctis rufescentibus; pedibus flavis.* — Long. 10 millim., lat. 2 $^1/_2$ millim.

Brunâtre obscur, médiocrement luisant, revêtu d'une fine pubescence fauve. Front rougeâtre en avant. Antennes de même

couleur, leur troisième article un peu plus long que le second. Prothorax plus long que large, très convexe, assez densément et également ponctué, offrant sur la ligne médiane, près de la base, un tubercule acuminé, ses angles postérieurs dirigés en arrière et assez fortement carénés le long de leur bord externe. Élytres courtes, atténuées en arrière, ponctuées-striées, les intervalles convexes et finement ponctués, leur extrémité brièvement et obliquement tronquée, leur base, ainsi que deux grandes taches confuses sur chacune, rougeâtres. Pattes flaves.

Un seul spécimen. Cette espèce est très remarquable, grace au tubercule de la base du prothorax.

52. **M. contiguus** (nov. sp.) N. Guin. (*D'Albertis*).

*Fusco-niger, dense griseo-pubescens; prothorace latitudine paulo longiore, convexo, confertissime aequaliterque punctato, angulis posticis retrorsum productis, carinatis; elytris brevibus, punctato-striatis apice emarginatis, plaga media obliqua, parum distincta, rufa; pedibus flavis.* — Long. 9 millim., lat. 2 $^1/_2$ millim.

Même forme que les précédents; noirâtre densément revêtu d'une pubescence grise qui voile et modifie notablement la teinte des téguments. Front arrondi et légèrement rougeâtre en avant. Antennes brunes. Prothorax un peu plus long que large, finement, très densément et également ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. Élytres deux fois et demie plus longues que le prothorax et de largeur égale, atténuées au bout avec l'extrémité brièvement échancrée, ponctuées-striées, les intervalles à peine convexes et densément pointillés, offrant dans leur milieu une bande oblique rougeâtre peu visible. Pattes flaves.

Deux exemplaires.

53. **M. Leluti**, Le Guillou, *Rev. Zool.* 1844, p. 220. — Cand., *Monogr.* II, p. 229.

Depuis l'époque dejà éloignée où Le Guillou, chirurgien à bord de la Zélée, découvrit cette espèce dans les parages du détroit de Torres, elle n'était plus, que je sache, venue dans

les collections européennes. M. L. M. D'Albertis l'a retrouvée en nombre à Somerset, en Janvier 1875. Elle se distingue nettement du *M. Australasiae* et des grandes espèces voisines, par son prothorax allongé, fortement sillonné dans toute sa longueur, et par les deux petites taches blanches formées de poils condensés qui en ornent le disque.

54. **M. regularis** (nov. sp.) Somerset, Cap York (*D'Albertis*).

*Niger, haud nitidus, pube tenui, sericea, fulvescente vestitus; antennis brunneis; prothorace latitudine longiore, a basi sensim angustato, crebre tenuiter regulariterque punctato, angulis posticis haud divaricatis, bicarinatis; elytris prothoracis latitudine, a basi attenuatis, punctato-substriatis interstitiis planis, rugoloso-punctulatis; pedibus rufis.* — Long. 14-17 millim., lat. 3 $^1/_2$-4 $^1/_2$ millim.

Allongé, noir, peu luisant, revêtu d'une pubescence fine, couchée, soyeuse, assez dense, à reflet fulvescent. Antennes brunes. Prothorax un peu plus long que large, rétréci depuis la base jusqu'au sommet, bombé régulièrement, semé de petits points assez denses, ses angles postérieurs dirigés en arrière, bicarénés. Élytres de la largeur du prothorax et deux fois et un quart plus longues, atténuées à partir de la base, finement striées, les stries ponctuées, les intervalles plats, finement rugueux et pointillés, l'extrémité brièvement échancrée. Pattes rousses. Dessous soyeux comme le dessus.

Cette espèce a un peu l'aspect du *M. brevipennis* M. L. mais elle est plus allongée. Il y a, parmi les *Monocrepidius* recuellis à Somerset par M. D'Albertis, quelques spécimens qui se rattachent plus ou moins à cette espèce; ils sont plus petits, bruns ou brun ferrugineux, et constituent peut-être un autre type spécifique, mais ceci est une question difficile à trancher par la raison suivante.

Les *Monocrepidius* d'Australie constituent un groupe d'insectes où les formes sont des plus instables et la délimitation des espèces hérissée des plus grandes difficultés. On y reconnait bien un certain nombre de types que l'on peut élever au rang d'espèces, en se conformant, la dessus, aux idées qui ont géné-

ralement cours aujourd'hui, mais ces mêmes types s'altèrent parfois à un point tel qu'ils arrivent à s'enchevêtrer, à se confondre de la façon la plus inextricable; de là l'impossibilité d'arriver à un classement tout-à-fait satisfaisant, à moins de laisser de côté les formes hybrides dans un véritable *caput mortuum*, pour me servir d'une expression employée par les chimistes, composé de ce qu'on appelle les *espèces douteuses*. La même remarque s'applique, mais à un moindre dégré, aux *Lacon* du même continent et à plusieurs autres genres de cette faune australienne qui fait le désespoir des nomenclateurs, ne le cédant à cet égard qu'à celle de la Nouvelle-Zélande où la Nature semble s'être livrée à un oubli complet des règles qu'elle s'est imposée plus ou moins ailleurs.

55. **M. basilaris** (nov. sp.) Somerset (*D'Albertis*).

*Brunneo-niger, parum nitidus, pubescens; prothorace latitudini longitudine subaequali, apice arcuatim angustato, convexo, punctato, angulis posticis haud divaricatis, carinatis; elytris punctato-striatis, interstitiis planis, punctatis basi anguste flavis; antennis pedibusque rufescentibus.* — Long. 6 millim., lat. 5 $^1/_2$ millim.

Cette petite espèce se distingue au premier abord par ses élytres marquées de flave à la base. Elle a plutôt l'aspect d'un *Anchastus* que d'un *Monocrepidius*, mais la structure de ses tarses ne laisse aucun doute sur la place qu'elle doit occuper au point de vue du genre.

J'en ai vu plusieurs exemplaires.

56. **M. flavicans** (nov. sp.) Somerset (*D'Albertis*).

*Flavicans, opacus, tenuiter sat dense pubescens; antennis longiusculis; prothorace latitudine vix longiore, sub quadrato, parum convexo, crebre, subtilissime inaequaliterque punctato, angulis posticis brevibus, longe tenuiter carinatis; elytris prothoracis latitudine, punctato-striatis, interstitiis tenuissime granulatis; subtus obscurior, pedibus flavis.* — Long. 6 millim., lat. 1 $^2/_3$ millim.

D'un jaunâtre plus ou moins obscur et mat, revêtu d'une pubescence fine, couchée et de la même couleur. Antennes assez

longues. Prothorax un peu plus long que large, peu rétréci au sommet, peu convexe, couvert d'une ponctuation très fine, serrée, inégale, ses angles postérieurs petits, finement et longuement carénés. Élytres de la largeur du prothorax et deux fois plus longues, déprimées, striées-ponctuées, les intervalles finement ruguleux. Dessous du corps plus obscur que le dessus. Pattes flaves.

57. **M. simulans** (nov. sp.) Somerset (*D'Albertis*).

*Praecedenti affinis sed prothorace paulo breviore, a basi sensim attenuato, fere aequaliter et fortius punctato.* — Long. 7 millim., lat. 2 millim.

La parenté de celle-ci avec la précédente est évidente et cependant la nature toute différente de la ponctuation du prothorax s'oppose à ce qu'elle soit laissée sous la même désignation spécifique. C'est une de ces espèces ambiguës dont j'ai parlé tout à l'heure.

## Heteroderes, Latr.

58. **H. Beccarii** (nov. sp.) Célèbes: Macassar (*Beccari*).

*Depressus, flavus, opacus, fusco-variegatus, pube flava, sub-erecta, dense vestitus; prothorace latitudini longitudine aequali, a basi leviter angustato, vitta media obscura, angulis posticis brevibus, haud carinatis; elytris profunde punctato-striatis, vitta suturali postice appendiculata obscura.* — Long. 5 millim., lat. 1 $^1/_2$ millim.

De forme elliptique allongée, deprimé, jaune mat, revêtu d'une pubescence à demi redressée, dense, de la teinte des téguments; le prothorax présentant une ligne médiane brune, les élytres offrant une bande large de même couleur le long de la suture, laquelle bande envoie extérieurement un rameau non loin de l'extrémité. Prothorax aussi long que large, ses angles postérieurs petits, dépourvus de carènes. Élytres profondément ponctuées-striées, les intervalles un peu convexes.

Plusieurs exemplaires.

59. **H. multilineatus** (nov. sp.) Célèbes: Macassar (*Beccari*).

*Depressus, flavus subnitidus, nigro-variegatus, pube flava, semierecta, vestitus; fronte nigra; prothorace longitudine latiore, a medio angustato, vitta media nigra, angulis posticis brevibus haud carinatis; elytris profunde punctato-striatis, vittis nigris abbreviatis, multis, variegatus.* — Long. 4 $^1/_2$ millim., lat. 1 $^1/_3$ millim.

Voisin du précédent et assez semblable au premier abord, mais s'en distinguant par plusieurs caractères de détail. La tête est noire. Le prothorax est manifestement moins long que large; enfin les élytres sont marquées d'une multitude de petites lignes noires confluentes à la base et plus nombreuses dans le voisinage de la suture que dans la partie externe.

Cette espèce, ainsi que la précédente, fait partie d'un petit groupe composé d'espèces indiennes et africaines que j'ai autrefois placé dans le genre *Aeolus* où elles constituent une section, la troisième, caractérisée par l'absence de carène aux angles postérieurs du prothorax ([1]). Un examen ultérieur des espèces en question m'engage à les détacher des *Aeolus*, genre propre à l'Amérique, pour les annexer aux *Heteroderes* avec lesquels elles ont une parenté évidente, notamment, avec l'espèce européenne, l'*H. cruciatus*.

60. **H. malaïsianus**, Cand., *Monogr.* I, pag. 359.

Un spécimen trouvé dans l'île de Timor par M. *L. M. D'Albertis*.

61. **H. triangularis**, Eschs., *Entomogr.* — Cand., *Monogr.* II, p. 36.

Deux exemplaires trouvés à Baly par M. Beccari. Cette espèce est commune aux Philippines et paraît répandue dans toute la Malaisie.

## PHYSORHINITES.

### Anchastus.

62. **A. longicornis** Cand., *Bull. Acad. Brux.* 1865, p. 28.

Un spécimen ♀ trouvé par M. Beccari à Hatam (N. Guinée).

([1]) CAND. Monogr. des Élat. II, p. 345.

63. **A. pisciculus** (nov. sp.), Hatam, N. Guin. (*Beccari*).

*Fuscus, opacus, breviter pilosulus; fronte antice carinata; antennis longiusculis brunneis; prothorace latitudine longiore, a basi leviter angustato, punctulato, angulis posticis retrorsum productis, carinatis, rufescentibus; elytris punctato-striatis, basi granulatis et rufescentibus.* — Long. 6 millim., lat. 1 $^1/_3$ millim.

Plus étroit, plus cylindrique que le précédent, brun mat, le front, la base du prothorax et celle des élytres, ainsi que l'écusson, passant au rougeâtre, revêtu d'une pubescence courte, rude, à demi redressée, de même couleur.

Front présentant dans sa moitié antérieure une carène longitudinale assez forte. Antennes aussi longues que la moitié du corps, brun rouge, leur troisième article intermédiaire pour la longueur entre le second et le quatrième. Prothorax plus long que large, légèrement rétréci en avant à partir de la base, ses côtés droits, finement ponctué, les points non ombiliqués (en quoi il diffère surtout du *longicornis*), ses angles postérieurs aigus, dirigés en arrière, fortement carénés. Élytres de la largeur du prothorax, assez fortement ponctuées-striées, les intervalles pointillés et subrugueux, granuleux à la base. Pattes testacées.

Je n'en ai vu qu'un seul spécimen.

64. **A. nitidulus** (nov. sp.) Hatam, N. Guin. (*Beccari*).

*Angustus, nitidus, niger, griseo-pubescens; antennis brunneis, articulo tertio secundo paulo longiore; prothorace latitudine sesqui longiore; apice tantum angustato, convexo, crebre aequaliter punctato, angulis posticis retrorsum productis, acute bicarinatis; elytris punctato-striatis; pedibus brunneis.* — Long. 11 millim., lat. 2 $^1/_4$ millim.

Étroit et allongé, assez luisant, noir passant au brunâtre sur les élytres, revêtu d'une fine pubescence grise, couchée. Front un peu redressé en avant. Antennes courtes, d'un brun rouge, leur troisième article un peu plus long que le second. Prothorax notablement plus long que large, parallèle en arrière, très bombé, finement et régulièrement ponctué, ses angles posté-

rieurs longs, aigus, dirigés en arrière, fortement bicarénés. Élytres parallèles, ponctuées-striées, les intervalles à peu près plats, ponctués. Pattes jaunâtres, les cuisses de couleur plus claire.

Un seul spécimen.

## ELATÉRITES.

### Drasterius, Eschs.

65. **D. apicalis** nov. sp.) Célèbes, Macassar (*Beccari*).

*Fusco-niger, incondite griseo-pubescens; antennis brunneis; prothorace longitudine latiore, apice arcuatim angustato, aequaliter punctato, angulis posticis rufescentibus; elytris profunde punctato-striatis, dimidia parte postica guttulis quatuor flavis notata; pedibus testaceis.* — Long. 4-4 $^1/_2$ millim., lat. 1 $^1/_4$-1 $^1/_3$ millim.

Var. **a.** *Elytris apice tantum bimaculatis.*

Var. **b.** *Elytris guttulis quatuor obsoletis.*

Noir ou noir brun, pubescent, les angles du prothorax teintés de rougeâtre et les élytres marquées dans leur moitié postérieure de quatre petites taches flaves, les taches parfois réduites aux deux apicales, parfois même tout-à-fait effacées. Front grand, régulièrement bombé, ponctué assez fortement. Antennes brunes. Prothorax plus large que long, rétréci au sommet, assez luisant, convexe, régulièrement ponctué; les angles postérieurs dirigés en arrière avec leur pointe seule faiblement courbée en dehors, portant une carène rapprochée du bord externe. Élytres à peine aussi larges que le prothorax, courtes, profondément ponctuées-striées, les intervalles peu convexes et pointillés. Pattes testacées.

Recuelli en grande quantité, en Janvier 1874.

### Megapenthes, Kies.

66. **M. marginatus** (nov. sp.) Borneo, Sarawak et Singapore (*Doria* et *Beccari*).

*Bajulus, lateribus nigricans, nitidus, griseo-pilosulus; prothorace*

*latitudine longiore, apice angustato, regulariter punctato, punctis lateribus umbilicatis, angulis posticis divaricatis, bicarinatis; elytris elongatis, punctato-striatis, interstitiis planis, apice late emarginatis, mucronatis; corpore subtus, antennis pedibusque concoloribus.* — Long. 14 millim., lat. 3 millim.

Brun rouge, luisant, les côtés passant au noir, revêtu d'une pubescence grise. Front légèrement convexe, marqué de points ombiliqués. Antennes assez courtes, brunes. Prothorax plus long que large, assez fortement rétréci en avant à partir du milieu, médiocrement convexe, ponctué, les points des portions latérales antérieures ombiliqués, présentant un sillon large et court en arrière, ses angles postérieurs divergents, bicarénés. Écusson pentagonal. Élytres un peu plus larges que le prothorax à la base, attenuées graduellement de la pointe jusqu'au sommet, ponctuées-striées, les intervalles plats et éparsément ponctués, leur extrémité largement échancrée et munie d'une épine à l'angle externe de l'échancrure. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus.

67. **M. niger** (nov. sp.) Célèbes, Kandari (*Beccari*).

*Elongatus, niger, nitidus, parce griseo-pubescens; fronte antice arcuata; prothorace latitudine longiore, a medio angustato, minus convexo, minus dense punctato, angulis posticis divaricatis, bicarinatis; elytris apice a medio arcuatim attenuato, punctato-striatis, interstitiis planis, apice integris; antennis pedibusque brunneis.* — Long. 15 millim., lat. 3 millim.

Allongé, noir luisant, revêtu d'une fine pubescence grise peu dense. Front légèrement convexe, arrondi en avant. Antennes brunes. Prothorax plus long que large, rétréci à partir du milieu, médiocrement convexe, finement et peu densément ponctué, sillonné au milieu en arrière, ses angles postérieurs allongés, divergents, bicarénés. Élytres longues, atténuées au bout, ponctuées-striées, les intervalles plats, leur extrémité échancrée fortement avec la dent externe de l'échancrure spiniforme. Pattes brunes.

Un seul exemplaire. Cette espèce a toute l'apparence d'un

*Diploconus*. Il diffère du *diploconoides* entre autres caractères par les angles postérieurs du prothorax bicarénés.

68. **M. junceus**, Cand., *Bull. Acad. Brux.* 1865, pag. 30. — *Ann. Soc. Entom. Belg.* XVIII.

Cette espèce, décrite primitivement comme habitant les Philippines, se rencontre également à Bornéo. Plusieurs specimens trouvés à Sarawak par M.rs Doria et Beccari, ne diffèrent pas sensiblement de ceux découverts dans les environs de Manille par M. Semper. Un exemplaire de Céram me semble également se rapporter à la même espèce.

69. **M. suturalis** (nov. sp.) Nouv. Guin. bor. Andai (*L. M. D'Albertis*).

*Testaceo-ferrugineus, nitidus, flavo-pilosulus; prothorace latitudine paulo longiore, apice tantum angustato, parce subtiliter punctato, angulis posticis bicarinatis; elytris postice attenuatis, apice emarginatis, punctato-striatis, sutura nigricante.* — Long. 12 millim., lat. 3 millim.

Espèce très-voisine de la précédente. Sa forme est un peu moins cylindrique, un peu plus large, son prothorax moins allongé, plus finement et moins densément ponctué, enfin ses élytres sont teintées de noir à la suture.

Un spécimen.

70. **M. inconditus**, Cand., *Monogr.* II, pag. 504.

Un spécimen rencontré à Célèbes, Kandari, par M. Beccari. Il se rapporte à l'espèce des Philippines, avec cette faible variation que les élytres sont vaguement quadrimaculées d'une teinte un peu plus claire que la teinte générale.

71. **M. punctatus** (nov. sp.) Nouv. Guinée sept., Ramoi (*L. M. D'Albertis*).

*Castaneus, opacus, breviter pubescens; prothorace latitudine haud longiore, apice arcuatim angustato, convexo, crebre punctato, angulis posticis brevibus, retrorsum productis, unicarinatis; elytris punctato-*

*striatis, interstitiis crebre punctatis, apice integris.* — Long. 9 millim., lat. 2 millim.

Tournure générale des précédents, mais plus petit. Ses angles prothoraciques unicarénés et ses élytres entières au bout l'en éloignent suffisamment. On ne pourrait le confondre, grâce à ces caractères, qu'avec le *M. mutulus* de Java dont il diffère beaucoup d'autre part.

72. **M. carinatus** (nov. sp.) Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

*Brunneus, parum nitidus, brunneo-pilosulus; prothorace quadrato, convexo, crebre punctato, angulis posticis retrorsum productis, fortiter et longe bicarinatis; elytris brevibus, prothorace angustioribus, a basi attenuatis, apice integris, striis interstitiisque punctatis; antennis pedibusque rufescentibus.* — Long. 9 millim., lat. 1 $^1/_3$ millim.

Cette espèce se distingue particulièrement par la grandeur relative de son prothorax, plus large que les élytres, et surtout par les fortes carènes qui se remarquent sur les angles postérieurs de la même pièce.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire.

73. **M. dorsalis** (nov. sp.) Java, N. Guinée (*Beccari*).

*Rufescens, breviter pubescens; fronte basi nigricante; prothorace latitudine paulo longiore, a basi attenuato, crebre punctato, opaco, disco nigricante, angulis posticis flavescentibus, unicarinatis; elytris flavo-testaceis, profunde punctato-striatis, interstitiis convexis, punctatis, apice subintegris; pedibus flavis.* — Long. 6 $^1/_2$ millim.; lat. 1 $^1/_2$ millim.

Assez petit, peu luisant; jaunâtre avec le prothorax rougeâtre en avant, son disque noir, pubescent. Front roux avec la base noire, très-fortement ponctué. Antennes assez courtes, brunes. Prothorax un peu plus long que large, rétréci depuis la base, avec ses côtés peu courbes, convexe, densément ponctué, opaque, ses angles postérieurs prolongés dans la direction des bords latéraux, unicarénés. Écusson noirâtre. Élytres de la largeur du prothorax, profondément ponctuées-striées, les intervalles conve-

xes et densément ponctués, leur extrémité à peine visiblement échancrée.

Trouvé en nombre par M. Beccari, à Java, Tcibodas, en Octobre 1874 et à Hatam (Nouv. Guin.) en Sept. 1875.

### Melanoxanthus, Eschs.

74. **M. vittatus**, Cand., *Bull. Acad. Belg.* 1865, p. 32.

Un spécimen trouvé par M.rs *Doria* et *Beccari* à Sarawak, Bornéo.

75. **M. ligatus** (nov. sp.) Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

*Ater, opacus, fusco-pubescens; prothorace latitudine paulo longiore, crebre fortiterque punctato, angulis posticis carinatis; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis convexis, punctatis, basi vittaque laterali rufo-testacea; pedibus rufis.* — Long. 8-10 millim., lat. 2-2 $^1/_2$ millim.

Espèce très reconnaissable au système de coloration des élytres. Un seul exemplaire a été trouvé à Sarawak. J'en possède plusieurs provenant de Hong-Kong. Ces derniers ont le maximum de la taille indiquée ci-dessus et ils diffèrent en outre de l'individu de Bornéo par le prothorax un peu plus rétréci en avant, à angles postérieurs plus divergents et par la pubescence plus forte. À part ces dissemblances il y a conformité dans les autres détails de structure et de coloration.

Le *M. ligatus*, de même que le *vittatus* et l'*epitrotus*, serait aussi bien placé dans le genre *Megapenthes* que dans celui-ci. Les différences qui séparent ces deux genres, différences dont la principale réside dans la structure plus ou moins filiforme des antennes, tendent à disparaître à mesure que de nouvelles découvertes ajoutent un contingent de plus en plus nombreux aux rares espèces connues à l'époque dejà reculée de leur établissement. Il est peu de collections, venant des Indes, que n'en renferment quelques espèces inédites, ce qui indique qu'elles y sont fort nombreuses, et que nous sommes encore loin d'en avoir épuisé la série. Il me paraît que ces deux genres, qui re-

présentent dans les régions tropicales de l'ancien continent, notre G. *Elater*, pourraient sans inconvénients être réunis en un seul que l'on diviserait simplement en deux sections.

Provisoirement, je les ai maintenus dans la présente énumération.

76. **M. melanocephalus**, Fabr. *Sp. ins.* — Cand., *Monogr.* II, pag. 512. Célèbes, Macassar (*Beccari*).

Cette espèce est, comme on sait, répandue dans toute la zone équatoriale du globe.

77. **M. Doriae** (nov. sp.) Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

*Angustus, niger, opacus, nigro-pubescens; prothorace latitudine paulo longiore, rufo; plagis anticis duabus conjunctis, nigris; elytris punctato-substriatis, interstitiis subtiliter granulatis.* — Long. 8 millim., lat. 1 $^1/_2$ millim.

Étroit, d'un noir profond et mat, le prothorax rouge avec deux taches noires couvrant la moitié antérieure, revêtu d'une pubescence obscure. Front très-convexe, finement ponctué. Antennes noires, composées d'articles larges. Prothorax un peu plus long que large, rétréci en avant à partir de la base, finement et assez densément ponctué, ses angles postérieurs noirs, unicarénés. Élytres parallèles, granuleuses vers la base, finement ponctuées-striées.

Un exemplaire.

78. **M. partitus** (nov. sp.) Ternate (*Beccari*).

*Fusco-niger, opacus, fusco-pubescens; antennis obscuris; prothorace latitudine vix longiore, apice arcuatim angustato; crebre subtiliter punctato, basi anguste flavo; angulis posticis unicarinatis; elytris basi flavis, punctato-striatis.* — Long. 7-8 millim., lat. 1 $^3/_4$-2 millim.

Assez large, noir brunâtre opaque, le joint du thorax avec les élytres coloré en jaune flave, revêtu d'une pubescence obscure. Front convexe. Antennes courtes, brunes. Prothorax presque aussi large que long, très-rétréci au sommet, convexe,

finement et densément ponctué, sillonné en arrière, ses angles postérieurs dirigés en arrière, unicarénés. Élytres de la largeur du prothorax et deux fois plus longues, atténuées en arrière à partir de la base, ponctuées-striées, les intervalles plats et très ponctués. Pattes jaunes.

Je possède dans ma collection un exemplaire de la même espèce originaire de la Nouvelle-Guinée.

79. **M. proximus** (nov. sp.) Java, Tcibodas (*Beccari*).

*Fusco-niger, opacus, fusco-pubescens; antennis brunneis; prothorace latitudini longitudine aequali, apice arcuatim angustato, crebre punctato, basi anguste flavo, subtiliter granulato, angulis posticis bicarinatis; elytris basi flavo-maculatis, punctato-striatis.* — Long. 6 millim., lat. 1 $^1/_2$ millim.

Il ressemble au précédent à première vue: même taille ou à peu près, même aspect, même systême de coloration, mais il s'en distingue nettement par la présence de deux carènes très visibles sur chacun des angles postérieurs du prothorax.

80. **M. subcylindricus**, Cand., *Bull. Acad. Belg.* 1865, p. 35. Iles Arou (*Beccari*).

81. **M. decemnotatus** (nov. sp.) Java, Tcibodas (*Beccari*).

*Niger, opacus, griseo-pubescens; antennis nigris; prothorace conico, subtiliter punctulato, angulis posticis unicarinatis, basi flavo-notatis; elytris guttulis octo flavis; pedibus nigris.* — Long. 6 millim., lat. 1 $^1/_2$ millim.

Noir, opaque, revêtu d'une fine pubescence grise, orné de dix petites taches d'un jaune clair et vif: deux à la base des angles postérieurs du prothorax, deux oblongues à la base des élytres, quatre disposées en demi-cercle vers le milieu de celles-ci, deux au quart postérieur. Antennes entièrement noires. Prothorax conique, médiocrement convexe, finement et densément ponctué, ses angles postérieurs fortement carénés. Élytres superficiellement ponctuées-striées, échancrées au bout. Pattes noires.

Un seul exemplaire. Cette jolie espèce ressemble, quant au

nombre et à la disposition des taches, au *M. decemguttatus* de Mindanao, mais il s'en distingue par quelques caractères tranchés.

82. **M. quadrinotatus**, Cand., *Bull. Acad. Belg.* 1865, p. 35.
Célèbes, Kandari (*Beccari*).
Un individu.

83. **M. nigricornis** (nov. sp.) Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).
*Rufus, subopacus, antennis, scutello elytrisque nigris, tenuiter pubescens; prothorace latitudini longitudine aequali, punctulatus, angulis posticis carinatis; elytris brevibus, subtiliter punctato-striatis; pedibus nigris.* — Long. 5 millim., lat. 1 $^1/_2$ millim.

D'un rouge obscur, subopaque, avec l'écusson, les élytres, les antennes et les pattes noires, revêtu d'une fine pubescence. Antennes épaisses, leurs articles larges. Prothorax aussi large que long, rétréci au sommet, convexe, finement ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. Élytres courtes, finement granuleuses à la base, superficiellement ponctuées-striées, les intervalles plats et ponctuées, tronquées à l'extrémité.

84. **M. ruficollis** (nov. sp.) Nouv. Guin., Andaï (*D'Albertis*).
*Niger, opacus, prothorace rufo, tenuiter pubescens; prothorace latitudine paulo longiore, apice tantum angustato, subtilissime punctulato, angulis posticis carinatis, nigris; elytris prothorace angustioribus, brevibus, subgranulatis, punctato-substriatis, apice breviter truncatis; pedibus rufis.* — Long. 6 millim., lat. 1 $^1/_3$ millim.

D'un noir profond et mat, le prothorax rouge, revêtu d'une fine pubescence obscure, fauve sur le prothorax. Antennes courtes et noires. Prothorax un peu plus long que large, parallèle, rétréci brusquement au sommet, finement et densément ponctué, ses angles postérieurs courts, dirigés en arrière, carénés, noirs. Élytres peu allongées et un peu plus étroites que le prothorax, subgranuleuses, superficiellement ponctuées-striées, les intervalles plats et ponctués, brièvement tronquées au bout. Pattes rouges.

Un seul spécimen.

85. **M. morio** (nov. sp.) Célèbes, Kandari (*Beccari*).

*Totus niger, parum nitidus, nigro-pubescens; antennis brevibus; prothorace longitudine paulo latiore, apice arcuatim angustato, punctato, postice canaliculato, angulis posticis retrorsum productis, acute carinatis; elytris brevibus, a basi attenuatis, punctato-striatis, interstitiis granulatis.* — Long. 5 millim., lat. 1 $^2/_3$ millim.

Cette petite espèce est large eu égard à sa longueur, ce qui lui donne l'apparence d'un *Drasterius* plutôt que d'un *Melanoxanthus*. Sa couleur entièrement d'un noir profond la distingue de toutes les autres espèces connues.

Je n'en ai vu qu'un seul individu.

86. **M. brunneus** (nov. sp.) Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

*Brunneus, marginibus pallescens; subnitidus, griseo-pubescens; fronte longitrorsum medio acute carinata; prothorace latitudini longitudine aequali, lateribus parallelis, granulato-punctato, angulis posticis retrorsum productis, carinatis; elytris prothorace angustioribus, punctato-striatis, interstitiis basi granulatis; pedibus flavis.* — Long. 5 millim., lat. 1 $^1/_2$ millim.

Assez large, pubescent, brun médiocrement luisant, la moitié du front, le bord postérieur et les angles antérieurs du prothorax ainsi que le pourtour des élytres d'une teinte plus claire. Antennes de la longueur du prothorax, brun clair. Front anguleux en avant, parcouru dans toute sa longueur par une carène médiane. Prothorax aussi long que large, parallèle sur les côtés, convexe, granuleusement ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigus, carénés. Écusson triangulaire, très-déclive. Élytres plus étroites que le prothorax, ponctuées-striées, les intervalles plats, très-ponctués, granuleux en avant. Pattes flaves.

Un seul exemplaire.

87. **M. bivittatus** (nov. sp.) Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

*Niger, opacus, pubescens; fronte convexa, punctata; antennis nigris; prothorace latitudini longitudine aequali, tumido, crebre punctato, vittis duabus rufis; elytris a basi attenuatis, vitta obliqua*

*basali fasciaque media rufo-testaceis.* — Long. 5 millim., lat. 1 $^1/_3$ millim.

Noir, opaque, revêtu d'une pubescence courte, claire sur les taches, celles-ci consistant en deux larges bandes longitudinales sur le prothorax d'un rouge obscur, une tache oblongue, placée obliquement près de la suture, et une large bande transversale un peu au delà du milieu, toutes deux d'un rougeâtre testacé. Front très-convexe et très-ponctué. Antennes courtes, noires. Prothorax aussi large que long, droit et parallèle sur les côtés, très-bombé, finement et densément ponctué, ses angles postérieurs très-aigus, finement carénés. Élytres courtes, un peu plus étroites que le prothorax, atténuées à partir de la base, superficiellement striées, les intervalles granuleux. Pattes flaves.

Je connais une variété à élytres et pattes noires, le prothorax seul étant pourvu de bandes rougeâtres.

88. **M. taeniatus** (nov. sp.) Célèbes, Kandari (*Beccari*).

*Niger, opacus, tenuiter griseo-pubescens; fronte convexa, punctata; antennis basi flavis; prothorace latitudini longitudine aequali, subtilissime punctato, punctis umbilicatis, angulis posticis acutis, carinatis, flavis; elytris brevibus, punctato-striatis, interstitiis granulatis; vitta discoidali abbreviata testacea; pedibus flavis.* — Long. 3 millim., lat. 1 millim.

Très-petit, noir opaque, les élytres parées d'une bande longitudinale testacée, coudée, n'atteignant pas l'extrémité, revêtu d'une fine et courte pubescence grise. Front très-convexe, très-ponctué. Antennes noires, leur base jaune. Prothorax aussi long que large, très-bombé, marqué de points très-superficiels, ombiliqués, les angles postérieurs aigus, carénés, flaves. Élytres courtes, un peu plus étroites que le prothorax, finement ponctuées-striées, les intervalles plats et granuleux. Pattes testacées.

Cette petite espèce a été recoltée en grande quantité, en Mars 1874, par M. Beccari.

89. **M. angularis** (nov. sp.) Nouv. Guin., Hatam (*Beccari*).

*Niger, opacus, tenuiter pubescens; antennis basi testaceis; fronte*

*tumida; prothorace latitudine paulo longiore, a basi angustato, crebre punctato, angulis posticis flavis; elytris punctato-striatis, interstitiis granulatis.* — Long. 4 millim., lat. 1 millim.

Petit, entièrement noir mat, sauf la base des antennes et le bout des angles postérieurs du prothorax qui sont jaunes, revêtu d'une légère pubescence grise. Front très-bombé, ponctué. Prothorax un peu plus long que large, bombé, très-ponctué, rétréci d'arrière en avant, ses angles postérieurs courts, aigus, carénés. Élytres un peu plus larges que le prothorax, finement ponctuées-striées, les intervalles plats, granuleux. Pattes noires.

## POMACHILITES.

### Eschatroxus, Cand.

90. **E. holosericeus**, Cand. *Bull. Acad. Brux.* 1865, p. 37. Iles Arou (*Beccari*).

Primitivement décrit d'après des spécimens trouvés par M. Wallace dans les Moluques.

## CRYPTOHYPNITES.

### Cryptohypnus, Eschs.

91. **C. Javanus** (nov. sp.) Java, Tcibodas (*Beccari*).

*Niger, subnitidus, dense griseo-pilosulus; fronte impressa; antennis longis; prothorace latitudine paulo longiore, basi apiceque angustato; elytris convexis, punctato-striatis, striis internis subtilissime punctulatis, interstitiis convexis, pedibus nigris.* — Long. 2 $^1/_2$ mill., lat. $^3/_4$ mill.

Noir, densément revêtu d'une pubescence grise. Antennes longues, brunâtres. Prothorax un peu plus long que large, rétréci à la base et au sommet, sa plus grande largeur tombant sur le tiers postérieur, ponctué, ses angles postérieurs divergents et portant une courte carène. Élytres plus larges que le prothorax, bombées, striées assez fortement. Les stries internes à peine distinctement ponctuées. Pattes noires.

Il se rapproche de l'*insulsus* Cdz., du Japon.

92. **C. suturalis** (nov. sp.) Nouv. Guinée sept. Hatam (*Beccari*).

*Niger, nitidus nigro-pubescens, pubescentia suturae elytrorum cinerea; fronte lata, convexa; antennis nigris; prothorace transverso, convexo, antice coarctato, angulis posticis validis, acute et longe carinatis; elytris striis nullis.* — Long. 2 $^1/_4$ mill., lat. $^2/_3$ mill.

Cette petite espèce, dont je n'ai vu qu'un seul exemplaire, se place dans le groupe caractérisé par la longue carène des angles postérieurs du prothorax et l'absence de stries sur les élytres, groupe dont notre *C. minutissimus* est le prototype et qui comprend en outre les *C. ellipticus, ovalis, luteipes* du Japon, et *misellus* de Java, pour ne citer que les espèces de l'extrême orient.

Le caractère distinctif de celle-ci réside dans la couleur de sa pubescence, brune partout sauf à la suture des élytres où elle est cendrée.

## Arrhaphes, Cand.

93. **A. Gestroi** (nov. sp.) Java, Tcibodas (*Beccari*).

*Elongatus, niger, opacus, griseo-pilosulus, antennis pedibusque rufis; prothorace latitudine longiore, crebre fortiterque punctato, medio canaliculato; scutello rufescente; elytris punctato-striatis, interstitiis granulatis.* — Long. 5 mill., lat. 1 $^1/_3$ mill.

Noir, opaque, revêtu d'une pubescence qui lui communique une teinte générale grisâtre. Front carré, très-ponctué, plan. Antennes très-longues, pubescentes, rouge-jaunâtres, le premier article gros, les suivants allongés. Prothorax plus long que large, rétréci à la base et au sommet, granuleusement ponctué, sillonné dans toute sa longueur, ses angles postérieurs divergents, carénés, rougeâtres. Écusson rougeâtre, globuleux, placé dans une fossette ménagée à la base des élytres. Élytres plus larges que le prothorax, profondément ponctuées-striées, les intervalles convexes, granuleux surtout à la base. Pattes jaunes.

Cette remarquable espèce, dont j'ai vu plusieurs exemplaires, est la seconde du genre *Arrhaphes*. Fondé sur une espèce de Ceylan, ce genre se distingue de tous les autres de la famille

par la singulière conformation du thorax dont la face inférieure, totalement dépourvue de sutures entre le prosternum et les flancs, a le même aspect que la face dorsale. C'est une forme des plus caractérisées parmi les *Élatérides*.

## CARDIOPHORITES.

### Cardiophorus, Eschs.

94. **C. carduelis**, Cand. *Bull. Acad. Belg.* 1865, pag. 39. Singapore (*Doria* et *Beccari*).

95. **C. elegans** (nov. sp.) Célèbes, Kandari (*Beccari*).

*Niger, pubescens; prothorace sanguineo, antice nigro, punctis umbilicatis crebre adsperso; elytris guttis quatuor flavis.* — Long. 7 mill., lat. 2 $^1/_4$ mill.

Cette espèce est suffisamment caractérisée par l'elégante disposition de ses vives couleurs, elle n'exige donc pas une longue description. Elle a sa place à côté du *C. carduelis,* qui lui même se range dans le groupe des *C. anaticus, sexpunctatus, notatus, histrio,* etc.

Les crochets des tarses peuvent être considérés comme dépourvus de dents, à proprement parler, bien qu'ils présentent un élargissement à la base, indice d'un acheminement vers la forme qui caractérise les *Cardiophorus* de la seconde section.

96. **C. papuensis** (nov. sp.) Ile Yule, N. Guin. mérid. (*L. M. D'Albertis*).

*Niger, nitidus, cinereo-pubescens; prothorace latitudini longitudine aequali, apice angustato, postice attenuato, tenuiter punctato; elytris postice attenuatis, depressiusculis, punctato-striatis; antennis pedibusque rufo-castaneis; unguiculis dentatis.* — Long. 6-7 mill., lat. 2 mill.

Noir, luisant, revêtu d'une pubescence gris blanchâtre très visible à l'oeil nu. Prothorax aussi long que large, rétréci brusquement au sommet, atténué en arrière en sorte que sa plus

grande largeur tombe en avant de la ligne moyenne, assez convexe et finement pointillé, les sillons basilaires latéraux bien marqués. Élytres de même largeur que le prothorax, déprimées, un peu atténuées au bout avec leurs côtés régulièrement courbes, striées, les stries fortement ponctuées, les intervalles finement pointillés. Antennes et pattes rougeâtres; onglets dentés.

Cette espèce qui a été rencontrée en nombre, en Avril 1875, a l'apparence d'un de nos *Cardiophorus* européen, tel, par exemple, que le *rufipes* ou le *vestigialis*.

## Horistonotus, Cand.

97. **H. longicornis** (nov. sp.) Somerset, Cap York (*L. M. D'Albertis*).

*Castaneus, subnitidus, griseo-pubescens; antennis dimidio corporis longioribus; prothorace quadrato, dupliciter punctato; elytris prothorace latioribus, parallelis, fortiter punctato-striatis, interstitiis rugulosis; pedibus concoloribus, unguiculis dentatis.* — Long. 5 $^1/_2$ mill., lat. 1 $^1/_2$ mill.

D'un brun châtain, peu luisant, revêtu d'une pubescence visible à l'oeil nu, grise. Antennes plus longues que la moitié du corps. Prothorax aussi large que long, carré, un peu convexe, couvert d'une double ponctuation, c'est-à-dire de points fins et serrés parmi lesquels sont disséminés des points plus gros, les angles postérieurs petits, les sillons basilaires latéraux bien marqués. Élytres plus larges que le prothorax, parallèles, déprimées, fortement ponctuées-striées, les intervalles convexes et ruguleux. Crochets des tarses onguiculés.

98. **H. consobrinus** (nov. sp.) Somerset (*L. M. D'Albertis*).

*Niger, nitidus, griseo-pubescens; prothorace quadrato, dupliciter punctato; elytris fortiter punctato-striatis; antennis pedibusque rufis.* — Long. 5 mill., lat. 1 $^1/_3$ mill.

Même forme que le précédent, mais noir luisant avec les antennes plus courtes, les élytres un peu moins larges comparativement au prothorax, les antennes et les pattes rouges.

## MÉLANOTITES.

### Diploconus, Cand.

99. **D. spiloderus**, Cand. *Bull. Acad. Belg.* 1865, pag. 45.
Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

100. **D. homostictus**, Cand. *Monogr.* III, pag. 295.
Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

101. **D. erythropus**, Cand. *Bull. Acad. Belg.* 1865, pag. 46.
Ternate (*Beccari*).

102. **D. erythronotus**, Cand. *Bull. Acad. Belg.* 1865, pag. 46.
Kandari, Célèbes; Salvatti (*Beccari*); N. Guinée, Ramoi (*L. M. D'Albertis*).

Cette espèce a été découverte primitivement aux îles Philippines par M. Semper. J'ai sous les yeux trois exemplaires des localités mentionnées ci-dessus. On voit que l'aire de distribution de cette jolie espèce est très-étendue. La taille indiquée dans la diagnose que j'en ai donnée autrefois doit être modifiée, cette taille variant entre 8 et 12 millimètres. La couleur des élytres varie également du brun rougeâtre au noir brillant; enfin la tête est rouge ce qui n'a pas été dit dans la diagnose en question.

103. **D. rufus**, Cand. *Monogr.* III, pag. 295.
Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

Même remarque que pour le précédent en ce qui regarde l'*habitat*. Indiqué d'abord comme de Java, je l'ai revu provenant de diverses localités de la Malaisie.

### Melanotus, Eschs.

104. **M. rusticus**, Erichs. *Zeitschr.* III, pag. 107. — Cand. *Monogr.* III, pag. 338.
Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

105. **M. Albertisi** (nov. sp.) Nouv. Guinée, Andai, Hatam (*L. M. D'Albertis* et *Beccari*), Dorey, Ramoi (*Beccari*).

*Brunneus, nitidus, albido-pilosulus; fronte impressa; prothorace longitudine paulo latiore, minus dense punctato, angulis posticis carinatis; elytris disco pallescentibus, sutura margineque exteriori nigricantibus, punctato-striatis, interstitiis planis, punctatis; subtus pedibusque nigris.* — Long. 12 mill., lat. 3 mill.

Brunâtre, assez luisant, les élytres d'une teinte plus claire, avec la suture et le bord externe passant insensiblement au noir. Antennes fortement dentées à partir du quatrième article, le troisième un peu plus long que le second. Front impressionné en avant, fortement ponctué. Prothorax un peu plus large que long, convexe, ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. Élytres de la largeur du prothorax, peu profondément ponctué-striées, les intervalles ponctués. Dessous du corps et pattes noires.

Cette espèce a été trouvée en nombre.

106. **M. ruficaudis** (nov. sp.) Célèbes, Kandari (*Beccari*).

*Niger, nitidus, albido-pilosulus; prothorace latitudini longitudine aequali, sparsim punctato, angulis posticis retrorsum productis, carinatis; elytris striato-punctatis, interstitiis punctatis, apice rufis.* — Long. 11 mill., lat. 3 mill.

Noir luisant, le tiers apical des élytres rouge, revêtu de poils blanchâtres assez longs mais peu serrés. Antennes brunes, assez courtes, fortement dentées à partir du quatrième article, le troisième à peine plus long que le second. Front fortement ponctué. Prothorax à peu près aussi long que large, peu densément ponctué, ses angles postérieurs carénés. Élytres de la largeur du prothorax, striées-ponctuées avec les intervalles plats et ponctués. Pattes noirâtres avec les cuisses rougeâtres.

Il se trouve aussi aux îles Arou, où il a été capturé par le baron de Rosenberg. Il se place, de même que le précédent, à côté du *M. ebeninus*.

107. **M. ebeninus**, Cand. *Monogr.* III, pag. 335.

Ternate (*Beccari*); Banda (*L. M. D'Albertis*).

Indiqué primitivement comme propre aux Philippines, où il est du reste commun dans toutes les îles, on le rencontre également, non seulement dans les îles mentionnées ci-dessus, mais encore à Amboine, à Céram, à Timor, d'où M. Wallace l'a rapporté.

108. **M. hirtellus**, Cand. *Monogr.* III, pag. 330.

Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

Cette espèce me parait représenter l'*ebeninus* dans les grandes îles Malaises. Elle en diffère peu, en effet, dans ses caractères principaux, et n'était sa pubescence notablement plus longue et plus hérissée, elle ne mériterait pas d'en être distinguée.

109. **M. aequalis** (nov. sp.) Nouv. Guinée, Andai (*Beccari*).

*Brunneo-niger, nitidus, aequaliter sat dense fulvo-pilosulus; prothorace latitudine paulo longiore, antice arcuatim angustato, aequaliter convexo, punctato, angulis posticis bicarinatis; elytris punctato-striatis; pedibus rufis.* — Long. 10 mill., lat. $2\,^2/_3$ mill.

Noir brunâtre, luisant, revêtu d'une pubescence à demi couchée, assez dense, fauve, à reflet soyeux. Antennes rougeâtres, hérissées de poils courts, leur troisième article un peu plus long que le second. Front plus long que large, arrondi en avant, très-ponctué. Prothorax un peu plus long que large, rétréci en avant avec ses côtés très-régulièrement arqués, médiocrement convexe, couvert de points subombiliqués vers les angles antérieurs, assez rares et petits vers la base, ses angles postérieurs non divergents, bicarénés. Élytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie plus longues, régulièrement arquées sur les côtés depuis la base, faiblement convexes, ponctuées-striées, les intervalles un peu convexes et ponctués. Pattes rouges.

110. **M. porcellus** (nov. sp.) Java, Tcibodas (*Beccari*).

*Brunneus, opacus, sordide pilosulus; prothorace latitudine haud longiore, convexo, fortiter confluenterque punctato, angulis posticis*

*longe carinatis; elytris punctato-striatis, interstitiis convexis, punctatis, apice acuminatis; pedibus rufis.* — Long. 10 mill., lat. 2 $^2/_3$ mill.

Assez épais et subcylindrique, d'un brunâtre obscur, revêtu de poils courts et assez inégalement dirigés. Front plus court que large, très-incliné, ponctué-rugueux. Antennes courtes, rougeâtres, leurs articles 2 et 3 égaux et plus long réunis que le quatrième. Prothorax aussi large que long ou même un peu plus large, curvilinéairement rétréci au sommet, assez convexe, densément marqué de gros points, les points confluents, même sur les parties latérales, sillonné au milieu en arrière, ses angles postérieurs courts, dirigés en arrière, munis d'une longue carène. Élytres parallèles en avant, subacuminées au sommet, fortement ponctuées-striées, les intervalles convexes et ponctués. Pattes rouges.

Un seul spécimen.

## CORYMBITITES.

### Corymbites, Latr.

111. **C. coarctatus** (nov. sp.) Java, Tcibodas (*Beccari*).

*Angustus, aeneus, pubescens; antennis longis; prothorace latitudine longiore, coarctato, medio sulcato, punctato, angulis posticis divaricatis, carinatis; elytris subparallelis, punctato-striatis, interstitiis planis, punctatis; abdomine rufescente.* — Long. 10 mill., lat. vix 2 mill.

Etroit et allongé, bronzé, pubescent. Antennes longues, rougeâtres, leur troisième article semblable de longueur et de forme au quatrième. Prothorax allongé, étranglé, parcouru au milieu et dans toute sa longueur par un sillon large et profond, densément ponctué, ses angles postérieurs divergents et carénés. Élytres allongées, parallèles, ponctuées-striées, les intervalles plats ou à peu près, ponctués. Pattes obscures, les cuisses teintes de rougeâtre dans leur pourtour; abdomen d'un rouge ferrugineux.

Cette espèce se classe dans la troisième section, à la suite des espèces américaines *cylindriformis, pyrrhos,* etc.

## LUDIITES.

### Ludius, Latr.

112. **L. variegatus** (noy. sp.) Iles Arou (*Beccari*).

*Fusco-niger, fulvo-pilosulus, fronte antice, prothorace postice maculisque elytrorum testaceis; prothorace crebre punctato, angulis posticis acute carinatis; elytris punctato-striatis, interstitiis planis, punctatis, pedibus testaceis.* — Long. 8 mill., lat. 2 mill.

Noirâtre, médiocrement luisant, pubescent, le bord antérieur du front, la base du prothorax et les taches oblongues sur les élytres plus ou moins vagues et confluentes, testacés. Antennes courtes, brun-rougeâtres, faiblement dentées. Front médiocrement convexe. Prothorax paraissant un peu plus long que large, convexe, densément ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. Élytres courtes, convexes, ponctuées-striées, les intervalles plats et ponctués. Pattes testacées.

Les caractères génériques de cette espèce sont manifestement affaiblis. Le front est moins convexe, les hanches postérieures moins larges et moins anguleuses que dans la majorité des *Ludius.* Elle a une tendance évidente à se rapprocher des *Melanoxanthus,* ce qui n'a rien de surprenant, ce dernier genre étant très-largement représenté dans les mêmes contrées. C'est visiblement une espèce de transition.

### Aphanobius, Eschs.

113. **A. cylindricus,** Cand. *Monogr.* IV, pag. 320.
Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

### Ludigenus, Cand.

114. **L. politus,** Cand. *Monogr.* IV, pag. 326.
Ile de Labuan (*Beccari*).

### Agonischius, Cand.

115. **A. pectoralis**, Cand. *Monogr.* IV, pag. 411.
Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

## ADRASTITES.

### Glyphonyx, Cand.

116. **G. dorsalis** (nov. sp.) Tcibodas, Java (*Beccari*).

*Niger, nitidus, pube cinerea obductus, fascia lata media elytrorum nigro-pubescente; prothorace latitudine paulo longiore, tenuiter punctato, angulis posticis divaricatis, rufescentibus; elytris prothorace latioribus, punctato-substriatis, interstitiis punctulatis, planis; pedibus rufo-brunneis.* — Long. 5 mill., lat. 1 $^1/_3$ mill.

Noir, le prothorax légèrement teinté de brunâtre, revêtu d'une pubescence cendrée interrompue au milieu des élytres par une large bande transversale où la pubescence est noire. Antennes assez courtes, grenues, rougeâtres. Prothorax un peu plus long que large, rétréci brusquement au sommet, ponctué, les points plus gros sur la partie antérieure qu'à la base. Élytres plus larges que le prothorax, finement ponctuées-striées, les intervalles plats et pointillés.

Un seul individu.

117. **G. zonatus** (nov. sp.) Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

*Rufo-ferrugineus, dense griseo-pubescens; fronte apice longitudinaliter medio carinata; prothorace tumido, crebre punctato; elytris seriatim punctatis, fascia lata media nigra.* — Long. 4 mill., lat. 1 $^1/_4$.

Rougeâtre densément revêtu d'une pubescence grise qui en modifie sensiblement la couleur, les élytres traversées dans leur milieu par une large bande noire. Front présentant à sa partie antérieure une crête longitudinale. Prothorax un peu plus large que long, très-bombé, épaissi en avant, assez densément ponctué,

ses angles postérieurs carénés, les sillons basilaires latéraux grands. Élytres courtes, bombées, marquées de séries de points, striées seulement à la base. Antennes et pattes de la couleur générale.

118. **G. quadrimaculatus** (nov. sp.) Tcibodas, Java (*Beccari*).

*Niger, nitidus, pubescens, elytris maculis oblongis quatuor flavis, anticis obliquis; prothorace longitudine paulo latiore, a basi angustato; elytris prothorace latioribus, profunde punctato-striatis, interstitiis punctulatis; pedibus flavis.* — Long. 3 $^1/_2$ mill., lat. 1 mill.

Petite espèce facilement reconnaissable à son système de coloration. Le prothorax est d'un noir luisant avec les angles postérieurs jaunes, rétréci d'arrière en avant à partir de la base, finement et éparsément ponctué. Les élytres sont parées de quatres taches jaunes oblongues, les deux antérieures allant obliquement des épaules vers la suture.

Je n'en ai vu qu'un seul spécimen.

## CAMPYLITES (1).

### Hemiops, Cast.

119. **H. nigricornis**, Cand. *Monogr.* IV, pag. 496.

Bornéo, Sarawak (*Doria* et *Beccari*).

(1) J'ai exposé ailleurs (*Révis. de la Monogr. des Elat.* I, p. VIII) les raisons qui m'ont déterminé à changer la terminaison des noms des tribus, et à écrire *Agrypnites, Alaïtes, Campylites*, etc., au lieu d'*Agrypnides, Alaïdes, Campylides*.

# RELEVÉ DES ESPÈCES

L'astérisque indique les espèces nouvelles.

**Agrypnus.**
*resectus.*
*aequalis.*
*mucronatus.*
*Mastersi.*

**Adelocera.**
*cribrata.*
*geographica.*

**Lacon.**
*tostus.*
*lupinosus.*
* *pauper.*
* *discedens.*
*serricollis.*
*Wallacei.*
*macroderus.*
*gracilis.*
* *subsericeus.*
* *impressus.*
*princeps.*
*variolus.*
*octavus.*
*crassus.*
* *asperulatus.*
* *cinerascens.*

**Meristhus.**
*minusculus.*

**Alaus.**
* *Albertisi.*
*elaps.*
*Boreli.*
*cerastes.*
*regalis.*
*scytale.*
*obliquus.*
*angularis.*
*arfakianus.*
*Doriae.*
*sericeus.*

**Campsosternus.**
*Candezei.*

**Tetralobus.**
* *Albertisi.*

**Sephilus.**
* *frontalis.*

**Pachyderes.**
*ruficollis.*
*apicalis.*

**Monocrepidius.**
* *mucronatus.*
* *guttatus.*
* *similis.*
* *aruensis.*
* *yulensis.*
* *horistonotus.*
* *pauperatus.*
* *corniculatus.*
* *contiguus.*

*Leluti.*
* *regularis.*
*basilaris.*
* *flavicans.*
* *simulans.*

**Heteroderes.**
* *Beccarii.*
* *multilineatus.*
*malaïsianus:*
*triangularis.*

**Anchastus.**
*longicornis.*
* *pisciculus.*
* *nitidulus.*

**Drasterius.**
* *apicalis.*

**Megapenthes.**
* *marginatus.*
* *niger.*
*junceus.*
* *suturalis.*
*inconditus.*
* *punctatus.*
* *carinatus.*
* *dorsalis.*

**Melanoxanthus.**
*vittatus.*
* *ligatus.*
*melanocephalus.*
* *Doriae.*
* *partitus.*
* *proximus.*
*subcylindricus.*
* *decemnotatus.*
*quadrinotatus.*
* *nigricornis.*
* *ruficollis.*
* *morio.*
* *brunneus.*
* *bivittatus.*
* *taeniatus.*
* *angularis.*

**Eschatroxus.**
*holosericeus.*

**Cryptohypnus.**
* *javanus.*
* *suturalis.*

**Arrhaphes.**
* *Gestroi.*

**Cardiophorus.**
*carduelis.*
* *elegans.*
* *papuensis.*
* *longicornis.*
* *consobrinus.*

**Diploconus.**
*spiloderus.*
*homostictus.*
*erythropus.*
*erythronotus.*
*rufus.*

**Melanotus.**
*rusticus.*
* *Albertisi.*
* *ruficaudis.*
*ebeninus.*
*hirtellus.*
* *aequalis.*
* *porcellus.*

**Corymbites.**
* *coarctatus.*

**Ludius.**
* *variegatus.*

**Aphanobius.**
*cylindricus.*

**Ludigenus.**
*politus.*

**Agonischius.**
*pectoralis.*

**Glyphonyx.**
* *dorsalis.*
* *zonatus.*
* *quadrimaculatus.*

**Hemiops.**
*nigricollis.*

---